

**CONSENSO INFORMATO ALL'INTERVENTO CHIRURGICO DI
DERMOLIPECTOMIA A CINTURA**

Dr PIERFRANCESCO BOVE
Medico Chirurgo

chirurgiadellabrezza

Consegnato il.....

Paziente.....Firma per ricezione.....

Si raccomanda il paziente di leggere scrupolosamente e con calma quanto segue, e assolutamente di non firmare in caso di incomprensione totale o parziale.

Prima di illustrarLe rischi vs benefici dell'intervento proposto è importante che lei sappia che:

lo scopo della chirurgia plastica estetica è quello correggere difetti o dismorfie di varia natura. Chi si aspetta dalla chirurgia plastica estetica trasformazioni miracolose è destinato a inevitabili delusioni.

La chirurgia plastica estetica comporta atti medici e chirurgici e, poiché la chirurgia non è una scienza esatta, non lo è nemmeno la chirurgia plastica estetica. Si deduce che non può essere pronosticata in modo preciso la percentuale di miglioramento del difetto da correggere, l'entità e la durata del risultato e la qualità delle cicatrici residue. E' necessario sottolineare che alcuni fattori condizionano il risultato finale: fra questi, in primo luogo ma non solo, i processi di guarigione e di cicatrizzazione che continuano per mesi dopo l'intervento e non sono completamente controllabili dal chirurgo, né dal paziente, le condizioni generali di salute e le abitudini di vita del paziente, la sua età, le caratteristiche specifiche della pelle e del tessuto sottocutaneo, l'aspetto fisico, e le influenze ormonali ed ereditarie. Tali elementi insieme ad altri fattori, influenzano la variabilità del risultato finale. Ogni atto chirurgico così come la chirurgia plastica estetica, produce inevitabilmente sequele, di differente entità a seconda del tipo d'intervento e del caso specifico, che

devono essere valutate prima di sottoporsi all'intervento: fra queste inevitabili sono le cicatrici. Il più delle volte, peraltro, a seguito di tali interventi, le ferite chirurgiche, situate lungo pieghe o solchi naturali, o comunque occultate per quanto possibile in sedi difficilmente accessibili allo sguardo, appaiono poco visibili, ma in realtà sono permanenti ed indelebili.

Talora, a causa di una particolare predisposizione individuale, di sopravvenute complicazioni post-operatorie o di una scarsa attenzione del paziente ai suggerimenti impartiti, le cicatrici possono risultare di qualità scadente. E' bene quindi ricordare che il chirurgo plastico può garantire solo delle ferite chirurgiche suturate con grande precisione, non delle cicatrici invisibili. Come in qualsiasi tipo di chirurgia, anche in chirurgia plastica estetica, sono possibili errori e complicanze. I primi, imprevedibili e indesiderabili e le seconde, prevedibili e a volte inevitabili, rientrano fra i rischi che ogni paziente deve considerare prima dell'intervento. Di conseguenza, per i suddetti motivi, pur rispettando le regole della chirurgia plastica, l'intervento potrebbe non determinare, seppure in casi particolari, il conseguimento degli obiettivi e del risultato auspicato che, di conseguenza, non può essere garantito o assicurato.

ISTRUZIONI

Questo documento è stato redatto per contribuire ad informarvi sull'intervento di DERMOLIPECTOMIA A CINTURA, sui relativi rischi e sui trattamenti alternativi.

È importante che leggete tutte queste informazioni con attenzione. Firmate ogni singola pagina, confermando di aver letto tutte le informazioni e firmate il consenso per l'intervento chirurgico suggerito dal Vostro chirurgo.

INTRODUZIONE

La DERMOLIPECTOMIA A CINTURA è una tecnica chirurgica è un intervento chirurgico che mira a rimuovere l'eccesso di pelle in seguito a un dimagrimento; si differenzia sostanzialmente da una addominoplastica in quanto non è necessario trasporre l'ombelico (o perché l'addominoplastica è stata già eseguita precedentemente o perché la quantità di pelle da rimuovere non è tale da determinare questa trasposizione).

TRATTAMENTI ALTERNATIVI

Trattamenti alternativi non chirurgici non esistono se il problema è esclusivamente legato ad un eccesso di pelle; al contrario, nel caso ci fosse dell'adipe (grasso) associato si potrebbe optare per procedure medico, dietetico, chirurgiche di diverso tipo che sono state già ampiamente illustrate e discusse col paziente

I RISCHI DI UNA DERMOLIPECTOMIA A CINTURA

Ogni intervento chirurgico comporta dei rischi seppur minimi ed è importante che capiate i rischi legati ad una dermolipectomia a cintura. La scelta individuale di sottoporsi ad un intervento chirurgico si basa sul confronto tra il rischio reale ed il beneficio potenziale. Anche se la maggior parte dei pazienti non avrà le complicazioni qui di seguito elencate, dovete analizzare ciascuna di queste complicazioni con il Vostro chirurgo per conoscere veramente tutte le conseguenze possibili di una cantopessi

Sanguinamento - E possibile, benché insolita, una perdita di sangue durante o dopo l'intervento. In caso di sanguinamento post-operatorio, può essere necessario un trattamento di emergenza per drenare il sangue accumulato (ematoma). Non prendere aspirine o farmaci antinfiammatori per dieci giorni prima dell'intervento, in quanto questo può aumentare il rischio di sanguinamento. Accumuli di sangue sotto la cute possono ritardare la guarigione e creare cicatrici. "Erbe" e supplementi dietetici possono aumentare il rischio di sanguinamento.

Infezione - L'infezione è abbastanza anomala in questo tipo di intervento. Se interviene un'infezione, è necessario continuare il trattamento antibiotico già iniziato o intraprendere un intervento supplementare.

Diminuita sensibilità della pelle – Dopo una dermolipectomia potrebbe verificarsi una eventuale diminuzione (o perdita) della sensibilità della pelle nella zona anatomica operata e potrebbe non scomparire completamente. Sensazioni costanti di prurito potrebbero verificarsi in questa area anatomica dopo questo tipo di intervento.

Irregolarità nel profilo - Irregolarità, depressioni e pieghe nella pelle adiacente la cicatrice potrebbero verificarsi dopo una dermolipectomia a cintura .

Cicatrizzazione – Cicatrici ipertrofiche sono rare. In alcuni casi, potrebbero formarsi delle cicatrici anomale. Le cicatrici possono risultare antiestetiche e di colore differente rispetto alla pelle circostante. Potrebbero rendersi necessari trattamenti supplementari compreso un altro intervento per eliminare una cicatrice anomala.

Modifica del metodo chirurgico per dermolipectomia a cintura - In alcune situazioni, a seconda di fattori emersi soltanto nel corso dell'intervento, il Vostro chirurgo potrebbe dover fare dei cambiamenti nella tecnica e nel metodo chirurgico di una dermolipectomia a cintura. Ciò potrebbe voler dire passare da un intervento con accessi chirurgici (tagli) differenti da quelli concordati pre-operatoriamente.

Anestesia chirurgica - Sia l'anestesia locale che totale comportano dei rischi. Vi è la possibilità di complicazioni, inconvenienti e addirittura di morte in tutte le forme di anestesia o sedazione.

Compromissione nervosa – Durante un intervento di dermolipectomia c'è il pericolo di danneggiare i nervi sensitivi. Dopo l'intervento possono verificarsi debolezza o perdita di motilità dell'area trattata. La maggior parte degli individui noterà un recupero della funzione motoria; l'astenia permanente è rara. Può anche verificarsi una compromissione dei nervi sensoriali dell'area. Può verificarsi una diminuzione di sensibilità nell'area, l'intorpidimento permanente o una cicatrice su un nervo dolorante sono rari.

Danneggiamento delle strutture più profonde - Le strutture più profonde, i nervi, i vasi sanguigni, ed i muscoli, possono essere danneggiate durante il corso dell'intervento. La possibilità che questo accada varia a seconda del tipo di intervento chirurgico scelto per la dermolipectomia.

Asimmetria -Il corpo è per sua natura asimmetrico. Sicuramente dopo l'intervento i due fianchi risulteranno asimmetrici se valutati singolarmente, come tutte le subunità tra i due emisomi; l'importanza di questo intervento però è dare armonia al corpo e rimuovere la pelle in eccesso.

Guarigione lenta – Può verificarsi un'apertura della ferita o una sua guarigione lenta. Alcune zone di pelle possono deperire, richiedendo frequenti cambi di fasciatura o ulteriori interventi per rimuovere il tessuto non guarito. **I fumatori hanno un rischio più elevato di perdita della pelle e di complicanze durante la guarigione.**

Reazioni allergiche – Raramente sono state segnalate allergie locali a cerotti, materiale di sutura o medicazioni. Le reazioni sistemiche più serie possono derivare dai farmaci usati durante la chirurgia o da farmaci prescritti. Le reazioni allergiche possono richiedere un trattamento supplementare.

Siero - Raramente si verificano accumuli di liquido sotto la pelle. Se questo accade, ciò può richiedere trattamenti supplementari per il drenaggio del liquido.

Effetti a lungo termine - Alterazioni del risultato a livello dei fianchi possono verificarsi dopo un certo periodo e sono riconducibili ad invecchiamento, perdita o aumento del peso, esposizione al sole o altre circostanze non legate all'intervento eseguito. L'intervento di dermolipectomia non arresta il processo di invecchiamento e non produce il rassodamento permanente dell'area trattata. Un ritocco o un intervento supplementare potranno rendersi necessari per mantenere costanti i risultati del lifting effettuato.

Dolore - Molto raramente si segnala dolore cronico dopo una dermolipectomia.

Fissaggi e suture più profonde - Alcune tecniche chirurgiche utilizzano suture profonde permanenti per sospendere le strutture dell'area operata. In circostanze molto rare, se venissero utilizzate suture permanenti, potrebbero verificarsi reazioni granulomatose da corpo estraneo che necessitano trattamento medico e/o chirurgico. In un secondo momento potrà essere necessaria la rimozione delle suture più profonde.

Risultato insoddisfacente - Potreste essere delusi dal risultato dell'intervento. Raramente, è necessario effettuare un ritocco per migliorare i risultati.

NECESSITÀ DI UN INTERVENTO SUPPLEMENTARE

Ci sono molte variabili oltre al rischio e alle complicazioni chirurgiche potenziali che possono influenzare il risultato duraturo di una dermolipectomia a cintura. Anche se i rischi e le complicazioni si verificano raramente, i rischi citati sono quelli che sono maggiormente associati con un intervento di dermolipectomia a cintura. Altre complicanze e rischi possono verificarsi, ma sono più rari. Se dovessero emergere delle complicazioni, può essere necessario un intervento supplementare o altri trattamenti. L'impiego della medicina e della chirurgia non è una scienza

esatta. Anche se sono prevedibili buoni risultati, non c'è garanzia assoluta o implicita che tali risultati possano essere ottenuti.

Autorizzo il Dr Bove

ed i suoi collaboratori ad eseguire su di me l'intervento di **DERMOLIPECTOMIA A CINTURA**

So che dovrò essere sottoposto/a ad anestesia

Autorizzo il Dr Bove

ed i suoi collaboratori a modificare secondo scienza e coscienza e secondo le contingenti necessità le tecniche programmate, sia nel corso dell'intervento stesso che nel periodo post-operatorio, essendo informato/a che, in caso contrario, potrei compromettere l'esito dell'intervento.

Poiché la chirurgia non è una scienza esatta, non può essere precisamente pronosticata a priori la percentuale di miglioramento del difetto da correggere e l'entità la durata del risultato, così come la qualità delle cicatrici residue e l'eventuale costituzione di ematomi e sieromi, in quanto tali eventi dipendono non solo dalle tecniche chirurgiche impiegate ma ancor più dalle risposte dell'organismo. Tali complicazioni possono essere trattate e a tal fine acconsento a sottopormi alle cure del caso, eventualmente anche chirurgiche.

Acconsento ad essere fotografato/a e/o ripreso prima, durante e dopo l'intervento dal Dr Bove e/o dalla sua equipe.

Esonero il Dr Bove e la sua equipe da qualsiasi tipo di controversia legale post operatoria (richieste di risarcimento) nel caso subentri una o più complicanze contemplate per questo intervento, a meno che non sia possibile chiaramente dimostrare una responsabilità diretta legata ad un errore professionale. Inoltre sono cosciente che nel caso subentrassero delle complicanze post operatorie che richiedono un reintervento dovrò sostenere le "spese vive" (clinica ed eventuali materiali protesici), mentre il supporto dell'equipe chirurgica sarà gratuito.

Firma del paziente.

.....

Firma del chirurgo

.....

Data e luogo

.....