

# chirurgiadellabellezza

Consegnato il.....

Paziente.....Firma per ricezione.....

**Si raccomanda il paziente di leggere scrupolosamente e con calma quanto segue, e assolutamente di non firmare in caso di incomprensione totale o parziale.**

Protocollo di consenso informato ad intervento di

## **LIPOFILLING**

Prima di illustrareLe rischi vs benefici dell'intervento proposto è importante che lei sappia che:

lo scopo della chirurgia plastica estetica è quello correggere difetti o dismorfie di varia natura. Chi si aspetta dalla chirurgia plastica estetica trasformazioni miracolose è destinato a inevitabili delusioni.

La chirurgia plastica estetica comporta atti medici e chirurgici e, poiché la chirurgia non è una scienza esatta, non lo è nemmeno la chirurgia plastica estetica. Si deduce che non può essere pronosticata in modo preciso la percentuale di miglioramento del difetto da correggere, l'entità e la durata del risultato e la qualità delle cicatrici residue. E' necessario sottolineare che alcuni fattori condizionano il risultato finale: fra questi , in primo luogo ma non solo, i processi di guarigione e di

cicatrizzazione che continuano per mesi dopo l'intervento e non sono completamente controllabili dal chirurgo, né dal paziente, le condizioni generali di salute e le abitudini di vita del paziente, la

sua età, le caratteristiche specifiche della pelle e del tessuto sottocutaneo, l'aspetto fisico, e le influenze ormonali ed ereditarie. Tali elementi insieme ad altri fattori, influenzano la variabilità del risultato finale. Ogni atto chirurgico così come la chirurgia plastica estetica, produce inevitabilmente sequele, di differente entità a seconda del tipo d'intervento e del caso specifico, che devono essere valutate prima di sottoporsi all'intervento: fra queste inevitabili sono le cicatrici. Il più delle volte, peraltro, a seguito di tali interventi, le ferite chirurgiche, situate lungo pieghe o solchi naturali, o comunque occultate per quanto possibile in sedi difficilmente accessibili allo sguardo, appaiono poco visibili, ma in realtà sono permanenti ed indelebili.

Talora, a causa di una particolare predisposizione individuale, di sopravvenute complicazioni post-operatorie o di una scarsa attenzione del paziente ai suggerimenti impartiti, le cicatrici possono risultare di qualità scadente. E' bene quindi ricordare che il chirurgo plastico può garantire solo delle ferite chirurgiche suture con grande precisione, non delle cicatrici invisibili.

Come in qualsiasi tipo di chirurgia, anche in chirurgia plastica estetica, sono possibili errori e complicanze. I primi, imprevedibili e indesiderabili e le seconde, prevedibili e a volte inevitabili, rientrano fra i rischi che ogni paziente deve considerare prima dell'intervento. Di conseguenza, per i suddetti motivi, pur rispettando le regole della chirurgia plastica, l'intervento potrebbe non determinare, seppure in casi particolari, il conseguimento degli obiettivi e del risultato auspicato che, di conseguenza, non può essere garantito o assicurato.

Lo scopo del seguente modulo di consenso è di fornire al paziente, in aggiunta al colloquio preoperatorio con il chirurgo, le informazioni riguardanti le caratteristiche ed i rischi connessi all'intervento di LIPOFILLING. La preghiamo per tanto di leggere attentamente quanto segue, di discutere con il Dott. Rauso la spiegazione di ogni termine che non fosse chiaro e quindi di firmare questo documento come conferma di avere ben compreso le informazioni ricevute.

Gli accumuli localizzati di grasso corporeo, possono essere asportati e reinseriti in varie zone del corpo e/o del viso, laddove il tessuto adiposo è venuto a mancare in seguito a traumi, al processo di invecchiamento, o semplicemente per modificare esteticamente l'area.

Il prelievo di tessuto adiposo può essere effettuato su qualsiasi area, ma le più comuni zone donatrici sono i fianchi, la regione interna delle ginocchia e l'addome. L'intervento è ripetibile.

All'intervento residuano cicatrici cutanee di minima estensione, collocate generalmente in corrispondenza dei solchi cutanei naturali e perciò destinate a diventare poco visibili; tuttavia, la cicatrizzazione è un processo di riparazione tissutale soggettivo, pertanto in taluni pazienti possono esistere cicatrici di cattiva qualità che possono necessitare ritocchi chirurgici, a distanza di almeno 3-4 mesi, per migliorarne l'aspetto.

Il tipo di anestesia, i tempi di degenza, la frequenza e il tipo di medicazioni, l'epoca della rimozione dei punti, dipendono dal singolo caso clinico e dalla tecnica impiegata.

L'effetto riempitivo dell'adipe trapiantato appare inizialmente maggiore rispetto a quello che sarà il risultato definitivo, evidenziabile a distanza di 6 mesi, in quanto una percentuale variabile dal 20% all'80% andrà incontro ad un processo di riassorbimento nei mesi post-operatori. Inoltre, a distanza di mesi (3-4 mesi) l'adipe trapiantato migliorerà quella che è la qualità della cute soprastante al sito di innesto.

L'area di prelievo dell'adipe non viene modificata esteticamente, a meno che non sia concordato col chirurgo nel pre-operatorio; in questo secondo caso bisognerà seguire tutte le indicazioni nonchè leggere, comprendere e firmare il consenso informato sulla Liposcultura.

### **PRIMA DELL'INTERVENTO DI LIPOFILLING**

- Informare il chirurgo di qualsiasi eventuale trattamento con farmaci (soprattutto cortisonici, contraccettivi, antipertensivi, cardioattivi, anticoagulanti, ipoglicemizzanti, antibiotici, tranquillanti, sonniferi, eccitanti, ecc.).
- Sospendere l'assunzione di medicinali contenenti acido acetilsalicilico (es. Alka Seltzer, Ascriptin, Aspirina, Bufferin, Cemerit, Vivin C, ecc).
- Eliminare il fumo almeno due settimane prima dell'intervento.
- Segnalare immediatamente l'insorgenza di raffreddore, mal di gola, tosse, malattie della pelle.
- Organizzare, per il periodo post-operatorio, la presenza di un accompagnatore/trice che può essere utile, anche se non indispensabile.

### **ALLA VIGILIA DELL'INTERVENTO DI LIPOFILLING**

- Praticare un accurato bagno di pulizia completo: lavare i capelli, rimuovere lo smalto dalle unghie delle mani e dei piedi.
- Non assumere cibi né bevande, a partire dalla mezzanotte.

### **IL GIORNO DELL'INTERVENTO DI LIPOFILLING**

- Mantenere rigorosamente il digiuno ed indossare un indumento da notte completamente apribile sul davanti con maniche molto comode.

### **DOPO L'INTERVENTO DI LIPOFILLING**

- Alla dimissione farsi accompagnare a casa in automobile.
- Per almeno 14 giorni, eliminare il fumo.

- Eventuali attività sportive possono essere generalmente riprese dopo 2 settimane
- Per almeno 1 mese evitare l'esposizione diretta al sole o al calore intenso (es. sauna, lampada UVA).

**Al minimo dubbio di un andamento anormale del periodo postoperatorio o per qualsiasi altro problema inerente l'intervento, consultate senza esitazione il Dr Rauso**

## CONSENSO INFORMATO AD INTERVENTO DI LIPOFILLING

Il sottoscritto/a....., nato a.....,  
il.....

**DICHIARA** di aver letto il protocollo di consenso informato unito alla presente scheda.

L'intervento mi è stato dettagliatamente illustrato dal Dr \_\_\_\_\_ e ritengo di averne compreso limiti e scopi.

In particolare so che:

- Nel periodo post-operatorio potrà essere presente un gonfiore e potrà essere avvertito, sia nelle zone donatrici che riceventi, un moderato dolore, che si attenuerà in un periodo variabile da pochi giorni a qualche mese (3-4) nel post-operatorio
- E' normale che si manifestino sulle regioni trattate degli edemi e delle ecchimosi importanti, destinati a scomparire
- La quantità di tessuto adiposo innestato che attecchirà è variabile e non del tutto prevedibile, con una percentuale che va dal 20% al 90%. Può però attecchire in maniera diversa in zone diverse, pertanto è possibile che si manifestino delle asimmetrie.
- La sensibilità della pelle potrà talora rimanere alterata in piccole zone per un periodo variabile, da pochi giorni a qualche mese, nel post-operatorio, raramente in modo permanente.
- In taluni casi, specie in pazienti non giovani o con pelle anelastica, nelle zone donatrici potranno residuare irregolarità e rilassamenti della superficie cutanea.
- La qualità delle cicatrici è indipendente dalla tecnica chirurgica ma legata alla reattività individuale, potrebbero pertanto esistere cicatrici ipertrofiche, cheloidee e anche una leggera iperpigmentazione.

- In rari casi si possono verificare delle raccolte ematiche o sierose, necrosi cutanee, processi infettivi, formazione di cisti derivanti da liponecrosi per mancato attecchimento, danni a nervi e/o vasi, pigmentazione delle aree trattate.

**Autorizzo il Dr**  
\_\_\_\_\_

ed i suoi collaboratori ad eseguire su di me l'intervento di **LIPOFILLING**

So che dovrò essere sottoposto/a ad anestesia .....

**Autorizzo il Dr**  
\_\_\_\_\_

ed i suoi collaboratori a modificare secondo scienza e coscienza e secondo le contingenti necessità le tecniche programmate, sia nel corso dell'intervento stesso che nel periodo post-operatorio, essendo informato/a che, in caso contrario, potrei compromettere l'esito dell'intervento.

Poiché la chirurgia non è una scienza esatta, non può essere precisamente prognosticata a priori la percentuale di miglioramento del difetto da correggere e l'entità la durata del risultato, così come la qualità delle cicatrici residue e l'eventuale costituzione di ematomi e sieromi, in quanto tali eventi dipendono non solo dalle tecniche chirurgiche impiegate ma ancor più dalle risposte dell'organismo. Tali complicazioni possono essere trattate e a tal fine acconsento a sottopormi alle cure del caso, eventualmente anche chirurgiche.

Acconsento ad essere fotografato/a prima, durante e dopo l'intervento, a scopo di documentazione clinica, che il Dr \_\_\_\_\_ si impegna ad usare solo in contesto scientifico-didattico con assoluta garanzia di anonimato.

.....

Firma del paziente

.....

Firma del chirurgo